



IndiTreat® mCRC Start

PACIENTES OBJETIVO

El análisis **IndiTreat® mCRC Start** va dirigido a pacientes con cáncer colorrectal metastásico diagnosticado recientemente (metástasis sincrónicas) o enfermedad localizada tratada anteriormente con aparición reciente de metástasis (metástasis metacrónicas). El objetivo del tratamiento farmacológico es reducir el tamaño de las metástasis para convertirlas en operables, o de tipo paliativo, para prolongar la supervivencia y mejorar la calidad de vida.


DIRECTRICES DE TRATAMIENTO

A los pacientes con metástasis no aptas para cirugía primaria se les ofrece un tratamiento sistémico de primera línea. Las opciones quimioterapéuticas son por lo general una combinación citotóxica doble como **FOLFOX** o **FOLFIRI** o, en un grupo muy escogido de pacientes, la combinación citotóxica triple **FOLFOXIRI** o la monoterapia con fluorouracilo. En la práctica, a la mayoría de los pacientes se les trata con **FOLFOX** o **FOLFIRI** en primera línea y, cuando la enfermedad progresa, se utiliza el régimen «opuesto» en segunda línea.

RESULTADO DEL TRATAMIENTO

El resultado promedio del tratamiento con FOLFOX y FOLFIRI en primera línea es comparable con una tasa de respuesta del 55 %, una supervivencia libre de progresión de 8 meses y una supervivencia global después de una «atención continua» de casi 3 años. Pero los pacientes responden de forma muy diferente al FOLFOX y FOLFIRI, y los datos sugieren que administrar la secuencia de tratamiento correcta (FOLFOX seguido de FOLFIRI frente a FOLFIRI seguido de FOLFOX) para un paciente determinado puede duplicar el periodo de supervivencia en comparación con la administración de la secuencia opuesta. El problema es que no existen biomarcadores para predecir esta respuesta.

MEDIANA DE SUPERVIVENCIA GLOBAL (MESES DESDE EL INICIO DEL TRATAMIENTO HASTA LA MUERTE)



(Clin Cancer Res 2021;27:1174-83)

IndiTreat[®]
by 2cureX

VALOR DEL TRATAMIENTO GUIADO

El valor único del análisis **IndiTreat® Start** es que se pronostica la respuesta individual del paciente a los diferentes regímenes farmacológicos en función de los tumoroides creados a partir de las células tumorales del propio paciente. Esto es muy importante, porque administrar el tratamiento correcto como primer paso aumenta las probabilidades de que el paciente se pueda operar o de prolongar significativamente la supervivencia libre de progresión y global.

IndiTreat® mCRC Start: PANEL DE FÁRMACOS	
Código para pedidos: 2CX-01-CRC-02	
5-fluorouracilo (5-FU)	FOLFIRI
FOLFOX	FOLFOXIRI



IndiTreat®
by 2cureX

2cureX

Fruebjergvej 3
2100 Copenhagen
Dinamarca

Correo electrónico:
support@2curex.com
www.inditreat.com